



Cancro in aumento tra giovani e anziani: Ã correlato allâobesitÃ , lo studio

Descrizione

(Adnkronos) â Lâimpatto del cancro Ã in aumento tra i giovani e gli anziani in tutto il mondo ed Ã correlato allâobesitÃ . Eâ quanto emerge da uno studio di sorveglianza che ha confrontato i trend internazionali di incidenza per 13 tipi di tumore negli adulti piÃ¹ giovani e in quelli piÃ¹ avanti con lâetÃ . Lo studio ha rilevato un aumento dei tassi di incidenza per diversi tipi di neoplasie nei Paesi studiati. E i tumori in cui i tassi di incidenza sono aumentati sia negli adulti piÃ¹ giovani che in quelli piÃ¹ anziani erano tutti correlati allâobesitÃ . Questi risultati, spiegano gli autori del lavoro pubblicato su âAnnals of Internal Medicineâ, possono contribuire a orientare le future prioritÃ della ricerca e le linee guida per la salute pubblica.

I ricercatori dellâInstitute of Cancer Research e dellâImperial College di Londra hanno studiato i dati annuali sullâincidenza del cancro dal 2003 al 2017 in 42 Paesi in Asia, Europa, Africa, Nord e Sud America e Australasia, presenti nel database Globocan dellâAgenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc). Sono stati valutati 13 tipi di cancro, precedentemente segnalati come in aumento in molti Paesi tra i giovani adulti: leucemia e cancro del colon-retto, dello stomaco, del seno, della prostata, dellâendometrio, della cistifellea, del rene, del fegato, dellâesofago, della bocca, del pancreas e della tiroide. Il cancro nei giovani adulti Ã stato definito come diagnosi tra i 20 e i 49 anni e negli adulti piÃ¹ anziani come diagnosi a 50 anni o piÃ¹. I tassi di incidenza del cancro sono aumentati nei giovani adulti in oltre il 75% dei Paesi esaminati per tiroide, mammella, colon-retto, rene, endometrio e leucemia.

Per tutti questi tipi di cancro, a eccezione del cancro del colon-retto, i tassi di incidenza sono aumentati anche nei piÃ¹ anziani. Per quanto riguarda il cancro del colon-retto, le tendenze allâaumento nei giovani adulti sono state maggiori rispetto a quelle negli anziani nel 69% dei Paesi. Per il cancro del fegato, del cavo orale, dellâesofago e dello stomaco, i tassi di incidenza sono diminuiti nei giovani adulti in oltre il 50% dei Paesi studiati. I risultati indicano che le variazioni nellâesposizione che determinano un aumento dei tassi di incidenza del cancro sono probabilmente comuni a tutte le fasce dâetÃ piuttosto che specifiche dei giovani adulti. I tipi di cancro che sono aumentati sia nei giovani adulti che negli anziani nella maggior parte dei Paesi erano tutti correlati allâobesitÃ , con il cancro dellâendometrio e del rene che sono stati i piÃ¹ fortemente associati allâobesitÃ . I modelli osservati nellâincidenza del cancro del colon-retto potrebbero inoltre essere dovuti allâesposizione

a nuovi agenti cancerogeni o a screening efficaci negli anziani. Nel complesso, concludono gli esperti
l'analisi suggerisce che in molti Paesi i tipi di cancro precedentemente osservati in aumento nei
giovani stanno aumentando sia in questa fascia di popolazione che negli anziani, e andrebbero
attentamente considerate le implicazioni di concentrare i nuovi studi su questi tipi di cancro solo sui
giovani.

â??

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Ottobre 21, 2025

Autore

redazione

default watermark