



Tumori neuroendocrini di polmone e timo, con cabozantinib -81% rischio progressione o morte

Descrizione

(Adnkronos) â?? Ipsen ha annunciato i risultati di unâ??analisi di sottogruppo dello studio di fase 3 Cabinet, che ha confrontato cabozantinib con placebo nei pazienti con tumori neuroendocrini pancreatici (pNETs) o extra-pancreatici (epNETs) avanzati, precedentemente trattati. Cabozantinib ha dimostrato un miglioramento della sopravvivenza mediana libera da progressione (mPFS), con una mPFS 3 volte superiore con cabozantinib rispetto al placebo in pazienti affetti da tumori neuroendocrini avanzati del polmone o del timo (NET). I dati sono stati presentati allâ??European Society of Medical Oncology Symposium (Esmo) a Berlino.

Lâ??analisi â?? riporta una nota â?? ha incluso 49 pazienti con NETs confermati del polmone e del timo su un totale di 203 pazienti appartenenti alla coorte epNET. Coerentemente con i risultati globali dello studio di fase 3 Cabinet, i dati di questa analisi di sottogruppo hanno dimostrato un miglioramento di mPFS di 8,2 mesi con cabozantinib rispetto a 2,7 mesi con placebo, con una riduzione del rischio di progressione di malattia o di morte dellâ??81%. Il profilo di sicurezza osservato di cabozantinib Ã?? risultato coerente con quello giÃ? noto; non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza.

â??I tumori neuroendocrini possono risultare difficili da gestire e, per circa un quarto dei pazienti la cui malattia origina nei polmoni, le opzioni terapeutiche sono rimaste fino ad ora particolarmente limitate â?? dichiara Chiara Marchesi, Medical and Regulatory Affairs Director Ipsen Italia â?? Questi risultati non solo confermano il valore di cabozantinib colmando unâ??importante lacuna terapeutica in unâ??area ad elevato bisogno medico insoddisfatto, ma riflettono anche lâ??impegno di Ipsen a ricercare nuove opzioni di trattamento per i tumori rari e complessiâ?•.

Nonostante il tasso di incidenza basso â?? prosegue la nota â?? i pazienti con NETs possono avere una lunga aspettativa di vita, con circa 40 pazienti su 100.000 che vivono attualmente con queste malattie in Italia: una prevalenza maggiore rispetto al tumore del pancreas o della vescica. La maggior parte dei NETs ha uno sviluppo lento e puÃ? avere origine in varie parti del corpo, e il 27% dei NETs origina nei polmoni. Le opzioni terapeutiche alla progressione sono spesso limitate e dipendono dalla sede primaria del tumore e da altri fattori, rendendo difficile definire la sequenza terapeutica ottimale per le esigenze individuali di ogni paziente. In particolare, per i pazienti affetti da NETs polmonari,

cabozantinib rappresenta la prima e unica terapia sistemica approvata nell'Ue alla progressione a una terapia sistemica non basata sugli analoghi della somatostatina.

Fino ad oggi, i trial clinici prospettici e i dati con elevati livelli di evidenza sui tumori neuroendocrini del polmone sono stati molto limitati spiega Sara Pusceddu, dirigente medico Sc Oncologia medica 1 Unit  di Oncologia gastrointestinale e neoplasie neuroendocrine Enets Center of Excellence, Milano. Questa carenza si   tradotta nella mancanza di un chiaro percorso terapeutico e di definite raccomandazioni nelle linee guida, rendendo complesso rispondere in modo personalizzato alle esigenze dei pazienti, soprattutto quando la malattia progredisce. I nuovi dati rappresentano un passo avanti importante: forniscono solide evidenze scientifiche sull'efficacia di cabozantinib nel ritardare la progressione della malattia e contribuiscono ad ampliare le opzioni terapeutiche disponibili per la comunit  scientifica, in una delle forme pi  frequenti di tumori neuroendocrini.

  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Ottobre 21, 2025

Autore

redazione