



Allarme infezioni sessuali, Ecdc: livelli record, in 10 anni +300% gonorrea e raddoppia la sifilide

## Descrizione

(Adnkronos)

Allarme sesso pericoloso in tutta Europa. Nel 2024 le infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) di origine batterica hanno raggiunto livelli record per il forte aumento di gonorrea e sifilide e il crescente divario nei test e nella prevenzione, indicano i nuovi dati dell'Ecdc Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che invoca azioni urgenti per prevenire un'ulteriore diffusione, anche tra le donne in et  fertile. Gli ultimi rapporti epidemiologici annuali dell'agenzia Ue, aggiornati al 2024, documentano un'impennata delle Ist, con le notifiche di gonorrea e sifilide, insieme alla sifilide congenita, che hanno raggiunto i livelli pi  alti da oltre un decennio, a testimonianza di una trasmissione sostenuta in diversi Paesi. In particolare, riporta una nota degli Ecdc, i dati relativi al 2024 mostrano che i casi di gonorrea hanno raggiunto quota 106.331, con un aumento del 303% rispetto al 2015. I casi di sifilide sono pi  che raddoppiati nello stesso periodo, arrivando a 45.577. La clamidia rimane l'infezione sessualmente trasmissibile pi  frequentemente segnalata, con 213.443 casi. Anche il linfogranuloma venereo (Lgv) ha continuato a essere trasmesso, con 3.490 casi segnalati.

Le Ist sono in aumento da 10 anni e hanno raggiunto livelli record nel 2024. Se non trattate, queste infezioni possono causare gravi complicazioni, come dolore cronico, infertilit  e, nel caso della sifilide, problemi cardiaci o al sistema nervoso, dichiara Bruno Ciancio, a capo dell'Unit  Malattie a trasmissione diretta e prevenibili con vaccini. La cosa pi  preoccupante sottolinea che tra il 2023 e il 2024 abbiamo assistito quasi a raddoppio dei casi di sifilide congenita, una malattia che si trasmette direttamente ai neonati, causando potenzialmente complicazioni permanenti. Proteggere la propria salute sessuale rimane semplice: usare il preservativo con partner nuovi o multipli e sottoporsi al test in caso di sintomi come dolore, secrezioni o ulcere, raccomanda l'esperto.

Le tendenze di trasmissione variano significativamente tra i diversi gruppi di popolazione, rileva l'Ecdc: Gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini rimangono il gruppo pi  colpito in modo sproporzionato, con i maggiori aumenti a lungo termine di gonorrea e sifilide. Tra le popolazioni eterosessuali la sifilide in crescita, in particolare tra le donne in et  fertile, con il conseguente quasi raddoppio dei casi di sifilide congenita, passati da 78 nel 2023 a 140 nel 2024, nei 14 Paesi che hanno

fornito dati?•. Numeri in linea con i risultati del report di monitoraggio Ecdc sulla sifilide congenita, che evidenzia â??mancate opportunità di prevenzione come lacune nello screening prenatale, la mancanza di follow-up e di test di controllo, nonché la carenza di trattamento?•. Il rapporto individua inoltre â??ostacoli piÃ¹ ampi alla diagnosi e alla prevenzione, che richiedono un intervento?•. In particolare, rimarca lâ??agenzia, â??13 dei 29 Paesi partecipanti al report continuano ad addebitare costi diretti per i test di base per le Ist. Lâ??implementazione disomogenea dei servizi e le strategie nazionali obsolete limitano lâ??impatto degli interventi comprovati â?? ammonisce lâ??Ecdc â?? poichÃ© molte strategie nazionali di prevenzione non tengono conto dei cambiamenti comportamentali post-pandemici?•.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie invita i Paesi europei a â??migliorare i protocolli di screening prenatale per garantire che la sifilide venga diagnosticata e trattata tempestivamente e correttamente in base allo stadio dellâ??infezione, al fine di prevenire la trasmissione al feto durante la gravidanza?•. Inoltre, lâ??agenzia Ue ricorda di aver fornito â??nel gennaio 2026 linee guida specifiche sullâ??uso della doxiciclina per la profilassi post-esposizione (doxy-PEP), a supporto degli sforzi di prevenzione delle Ist. Le persone esposte a un rischio maggiore di contrarre infezioni sessualmente trasmissibili dovrebbero consultare il proprio medico o un altro operatore sanitario per valutare opzioni di prevenzione personalizzate?•, suggerisce lâ??Ecdc che â??non raccomanda lâ??uso diffuso della doxy-PEP per la gonorrea â?? viene ricordato nella nota â?? a causa degli elevati livelli di resistenza antimicrobica e del rischio di unâ??ulteriore accelerazione dello sviluppo di tale resistenza?•.

â??Invertire la tendenza allâ??aumento dei casi di Ist â?? concludono gli esperti â?? richiede servizi di prevenzione accessibili, un accesso piÃ¹ agevole ai test, trattamenti piÃ¹ rapidi e una notifica piÃ¹ efficace ai partner per interrompere la trasmissione?•. Lâ??Ecdc esorta le autorità sanitarie pubbliche ad â??aggiornare urgentemente le strategie nazionali per le Ist?• e a â??rafforzare i sistemi di sorveglianza per monitorare meglio lâ??impatto delle attività di prevenzione?•. PerchÃ© â??senza unâ??azione decisa Ã” probabile che le tendenze attuali continuino, aumentando le conseguenze negative per la salute e ampliando le disuguaglianze nellâ??accesso alle cure?•.

â??

salute/sanita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

## Categoria

1. Comunicati

## Tag

1. Ultimora

## Data di creazione

Maggio 21, 2026

## Autore

redazione