



Morso di zecca e rischio encefalite, Bassetti: "Grave infezione virale, massima attenzione"

Descrizione

(Adnkronos) "Morta a un mese di distanza dal morso di una zecca, che le aveva provocato un'encefalite da Tbe rivelatasi purtroppo fatale. La vittima " una donna trentina di 76 anni. "La Tbe ("Tick-Borne Encephalitis", o encefalite da zecca) " una grave infezione virale che colpisce il sistema nervoso centrale, trasmessa dal morso di zecche infette o dall'ingestione di latte crudo non pastorizzato. In Italia si registrano focolai soprattutto nelle regioni del nord-est, come Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto (in particolare la provincia di Belluno)", ricorda su X l'infettivologo Matteo Bassetti.

- 1) Vaccinazione. "Esiste un vaccino efficace ed " fortemente raccomandato a chi risiede o frequenta abitualmente le zone a rischio", ricorda Bassetti;
- 2) Abbigliamento. "Indossare indumenti chiari (che rendono pi" facile individuare le zecche), pantaloni lunghi, scarpe chiuse e cappello durante le escursioni", continua;
- 3) Repellenti. "Applicare sulla cute prodotti specifici a base di Deet o altri principi attivi consigliati".

Cosa fare in caso di morso di zecca. "Rimuovere la zecca il prima possibile utilizzando una pinzetta, tirandola con decisione " conclude " Disinfettare accuratamente la zona dopo l'estrazione".

"

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Luglio 13, 2026

Autore

redazione

default watermark