Neurologo Habetswallner: â??Miastenia difficile da diagnosticareâ?•

Descrizione

default watermark

(Adnkronos) â?? â??In alcuni casi la miastenia gravis Ã¨ difficile da diagnosticare e purtroppo molto spesso Ã¨ diagnosticata in ritardo. Questo accade non per la difficoltÃ , ma perchÃ© Ã¨ una malattia rara e i medici che per primi visitano il paziente non ci pensano. Mediamente passa piÃ¹ di un anno tra lâ??esordio dei sintomi e la diagnosi correttaâ?•. CosÃ¬ Francesco Habetswallner, direttore Uoc Neurofisiopatologia Aorn Cardarelli di Napoli, durante lâ??evento â??Tutela del paziente con malattie rare: la miastenia gravis come paradigmaâ??, organizzato a Roma e promosso da Omar â?? Osservatorio malattie rare con il contributo non condizionato di Ucb Pharma.

â??Altri ostacoli che si possono incontrare â?? prosegue Habetswallner â?? riguardano il non trovare gli anticorpi, le forme sieronegative o i test effettuati che non sono di livello adeguato. Tutti questi problemi si riflettono sulla salute e sulla qualitÃ di vita del paziente, perchÃ© una diagnosi ritardata significa negare al paziente le terapie di cui ha necessitÃ e, in alcuni casi, esporlo a terapie che sono nocive per la sua saluteâ?•. I rischi sono quindi molteplici: â??Le conseguenze di una mancata diagnosi sono importanti. Tra queste â?? precisa lo specialista â?? lâ??assenza di una presa in carico, il ritardo delle cure, lâ??accumularsi di disabilitÃ . Eâ?? importante sensibilizzare tutti gli operatori sanitari per facilitare la diagnosi e anticiparlaâ?•.

â??

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione
Novembre 21, 2025

Autore
redazione

default watermark

EI SRL - P.IVA IT16017671005