



Patologie retiniche, Roche presenta nuovi dati su faricimab

Descrizione

(Adnkronos) â?? Roche ha annunciato oggi i nuovi dati dello studio â??Voyagerâ?®, che valuta lâ??efficacia, la durabilit  e la sicurezza di faricimab nella degenerazione maculare legata allâ??et  neovascolare (nAMD), nellâ??edema maculare diabetico (Dme) e nellâ??occlusione venosa retinica (Rvo). In tutte le coorti analizzate, i dati confermano lâ??efficacia nella real-world di faricimab in linea con i risultati di Fase III: i pazienti non trattati in precedenza mostrano un miglioramento della vista ed un robusto miglioramento dellâ??anatomia retinica, mentre quelli gi  trattati mantengono o migliorano la capacit  visiva, con un contestuale beneficio anatomico.

Nelle coorti nAMD e Dme dello studio â?? informa una nota â?? la vista e lo spessore foveale centrale (Cst) sono migliorati nei pazienti na ve alla terapia dopo 12 mesi di trattamento con faricimab, mentre nei pazienti precedentemente trattati la vista si   mantenuta stabile a fronte di un miglioramento del Cst. Per quanto riguarda lâ??Rvo, entrambe le varianti della malattia hanno mostrato un chiaro beneficio clinico dopo sei mesi di trattamento con faricimab. Nella coorte con Rvo centrale/emisferica, sia la vista sia il Cst sono migliorati indipendentemente dal fatto che gli occhi fossero mai stati trattati in precedenza o meno. Nella Rvo di branca, invece, i pazienti na ve hanno ottenuto un miglioramento visivo e anatomico, mentre nei pazienti gi  trattati si   osservata una stabilit  della vista accompagnata dal miglioramento del Cst. I dati sono stati presentati in occasione del Congresso Annuale Euretina 2026 a Vienna, Austria.

â??Questi risultati di real-world dimostrano come lâ??efficacia e la sicurezza di faricimab riscontrate negli studi clinici pivotali si traducano direttamente nella pratica clinica globale â?? ha dichiarato Levi Garraway, Chief Medical Officer e Responsabile dello Sviluppo Globale dei Prodotti di Roche -. I miglioramenti visivi duraturi e la significativa riduzione del fluido retinico osservati nello studio Voyager confermano il ruolo di faricimab nel rispondere a importanti bisogni terapeutici ancora insoddisfatti nei pazienti con patologie della retina . â??Nella pratica clinica quotidiana gestiamo popolazioni di pazienti eterogenee, con storie terapeutiche complesse che non sempre riflettono i rigidi criteri di inclusione degli studi controllati di fase 3 â?? ha affermato la professoressa Robyn Guymer, Chair del Steering Committee dello studio Voyager e Deputy Director del Centre for Eye Research Australia -. I pi  recenti dati dello studio Voyager confermano ai medici di tutto il mondo che faricimab offre miglioramenti visivi duraturi, una riduzione significativa del fluido retinico e un profilo di sicurezza

consolidato nella pratica quotidiana, sia quando il paziente inizia la terapia per la prima volta, sia quando effettua uno switch da un altro trattamento•.

I dati real-world di Voyager •• dettaglia la nota •• •• dimostrano una costante riduzione del fluido sottoretinico (Srf) e del fluido intraretinico (Irf) sia negli occhi na~ve che in quelli precedentemente trattati. Inoltre, nei gruppi nAMD e Dme, il numero di iniezioni di faricimab richiesto nei mesi 7-12 ~ risultato inferiore rispetto ai mesi 1-6, suggerendo una potenziale estensione degli intervalli di trattamento. In Voyager, il profilo di sicurezza di faricimab si ~ confermato generalmente in linea con quello evidenziato negli studi di Fase III relativi a nAMD, Dme e Rvo•.

A integrazione delle evidenze real-world, ••i recenti risultati a due anni dello studio di fase IIIb/IV Salween confermano lâ••efficacia duratura e la sicurezza di faricimab anche nel trattamento della vasculopatia polipoidale della coroide (Pcv), un sottotipo particolarmente severo e complesso di nAMD. Nello studio, faricimab ha mostrato un guadagno medio di 7,3 lettere dellâ••acuit~ visiva (Bcva) e una riduzione media dello spessore foveale centrale (Cst) di 127 ~m tra le settimane 100 e 108. Al secondo anno •• conclude la nota •• il 74% dei pazienti non presentava fluido retinico e lâ••86% ha ottenuto lâ••inattivazione delle lesioni polipoidali (con una regressione completa nel 62% dei casi). Inoltre, il 61% dei pazienti ha potuto estendere lâ••intervallo di somministrazione fino a 20 settimane, riducendo significativamente il carico terapeutico e mantenendo un profilo di sicurezza favorevole e coerente con quanto gi~ noto per la nAMD•.

••

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Ottobre 1, 2026

Autore

redazione