



Shamonda virus, primo caso umano in Francia: cosa sappiamo, tutti i rischi

Descrizione

(Adnkronos) • Un patogeno ai piA¹ sconosciuto sta spaventando la Francia, dove A² stato identificato il primo caso umano di virus Shamonda, in un paziente • gravemente malato • che A² • morto a inizio ottobre •. Lo ha annunciato il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che sta • monitorando attentamente la situazione in seguito alla notizia, diffusa dalle autorità francesi, del primo caso documentato di infezione umana da virus Shav. Un patogeno che finora aveva colpito esclusivamente gli animali •. L • Ecdc spiega di essere • in contatto con le autorità francesi e con i partner europei per esaminare le potenziali implicazioni per la salute pubblica derivanti da questo primo caso umano •.

• L • unica persona finora contagiata • dal virus Shamonda (Shamonda virus o Shav), informa l • Ecdc, • era un paziente giA³ affetto da una grave patologia, condizione che lo rendeva piA¹ vulnerabile alle infezioni e alle relative complicazioni rispetto alla popolazione generale. Il paziente A² morto all • inizio di ottobre • e • sono in corso accertamenti per stabilire se il virus abbia causato o abbia contribuito al decesso, nonchA³ per determinare le modalitA³ di trasmissione dell • infezione •. L • alert su questo primo caso umano di Shav arriva dopo • il primo rilevamento in assoluto del virus tra gli animali da allevamento in Europa, nell • estate del 2026.

La comparsa di segni clinici negli animali A² stata segnalata a partire da giugno • ricorda l • agenzia Ue • mentre l • identificazione di Shav risale alla fine di luglio. Da allora il virus A² stato riscontrato in animali da allevamento in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera e Jersey. In precedenza, Shav era giA³ stato rilevato negli animali in Paesi extraeuropei •.

Cos • il virus Shamonda? • E • un ortobunyavirus appartenente al sierogruppo Simbu, a cui appartiene anche il virus della malattia di Schmallerberg (Sbv). Individuato per la prima volta in Nigeria a metA³ degli anni • 60, era stato segnalato sporadicamente in Africa, Australia e Giappone.

Nell'estate del 2026 Ã stato rilevato per la prima volta in diversi Paesi dell'Europa centro-occidentale, in particolare Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Liechtenstein e Austria â riporta una circolare del ministero della Salute italiano che a metÃ settembre 2026, forse dopo il primo rilevamento in un allevamento Ue, faceva il punto sulla âCircolazione del virus Shamonda in Europa e Italiaâ- I bovini sono considerati gli ospiti principali, ma il virus Ã stato rilevato anche in ovini, caprini, alpaca e cavalli. La trasmissione avviene principalmente tramite vettori del genere Culicoides. Si tratta dello stesso vettore del virus della febbre catarrale ovina (Btv) e del virus della malattia emorragica epizootica (Ehdv).

Attualmente â riportava la circolare â non esistono prove di una significativa trasmissione diretta da animale ad animale, a eccezione della trasmissione verticale dalla madre al feto durante la gestazioneâ. Nel documento si affermava che âquesto virus non Ã trasmissibile all'uomo e non presenta quindi alcun impatto sulla salute pubblicaâ. Ora il primo caso umano in Francia cambia lo scenario.

»

Nei bovini, âi quadri clinici sono caratterizzati prevalentemente da febbre, diarrea e significativa riduzione della produzione latte. Il virus Ã stato inoltre riscontrato in associazione a eventi abortivi. I segni clinici appaiono piÃ lievi nei piccoli ruminanti rispetto ai bovini. L'infezione nel cavallo si manifesta con una grave sintomatologia neurologica. L'infezione da Shav non Ã una malattia listata ai sensi della normativa dell'Unione Europea in materia di sanitÃ animale e non Ã quindi soggetta a obbligo di notifica nÃ a misure ufficiali di sorveglianza e controllo. Attualmente non Ã disponibile alcun vaccinoâ, sottolinea la circolare.

Le misure di controllo piÃ efficaci âsi basano sulla protezione degli allevamenti dagli insetti vettori al fine di ridurre il rischio di infezione (eliminazione dei siti di deposizione delle uova, quali effluenti liquidi e zone di acqua stagnante, disinfestazione dei mezzi di trasporto). Premesso quanto sopra, si raccomanda all'allevatore, nel caso osservi nel proprio bestiame i sintomi sopra descritti (febbre, calo della produzione latte, diarrea, aborto), in particolare â conclude la circolare â durante il periodo di attivitÃ degli insetti vettori, di contattare il proprio veterinario che valuterÃ le necessarie terapie di supporto e gli opportuni approfondimenti diagnosticiâ.

â

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Ottobre 22, 2026

Autore

redazione

default watermark