

Artrite psoriasica, nuovi dati confermano efficacia guselkumab su dolore e rigiditÃ

Descrizione

default watermark

(Adnkronos) â?? I risultati dello studio Star, di fase 4 con guselkumab nellâ??artrite psoriasica (PsA) e coinvolgimento assiale diagnosticato con la risonanza, alla settimana 24, dimostrano che lâ??utilizzo del farmaco, in adulti con PsA attiva ed impegno assiale (axPsA), naive a farmaci biologici, Ã¨ associato a un miglioramento significativo dei sintomi assiali rispetto al placebo e a una riduzione significativa dellâ??infiammazione delle articolazioni sacroiliache valutata mediante risonanza magnetica (Rm). I dati â?? riferisce una nota â?? sono stati presentati in occasione del Congresso annuale della SocietÃ di reumatologia degli Emirati (Esr). Lo studio Star Ã¨ il primo randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, progettato per valutare in modo prospettico lâ??efficacia di un inibitore dellâ??Il-23 in pazienti con axPsA, confermata grazie allâ??utilizzo della Rm.

â??Identificare e valutare lâ??impegno assiale nellâ??artrite psoriasica puÃ² risultare difficile, lasciando ai medici pochi elementi su cui basarsi per selezionare i pazienti da includere negli studi clinici e, eventualmente, per le decisioni terapeuticheâ?•, afferma Mikkel Ostergaard, Clinical Professor of Rheumatology at the University of Copenhagen and Consultant in Rheumatology and Chairperson of the Copenhagen Center for Arthritis Research (Cpecare) at the Center for Rheumatology and Spine Diseases, Rigshospitalet, Glostrup.

â??Nello studio Star, guselkumab ha mostrato miglioramenti significativi nei sintomi riferiti dai pazienti e nellâ??infiammazione assiale a livello delle articolazioni sacroiliache, valutata mediante risonanza magnetica, in aggiunta al ben noto profilo di sicurezza. Nel loro insieme, questi risultati forniscono importanti evidenze per orientare al meglio le decisioni terapeutiche relative a questa specifica manifestazione dellâ??artrite psoriasica, oggi poco studiata, ma decisamente debilitanteâ?•.

Lâ??artrite psoriasica â?? si legge nella nota â?? Ã¨ una malattia muscolo-scheletrica eterogenea, di natura infiammatoria cronica immuno-mediata, che puÃ² causare danni permanenti alle articolazioni. Solitamente interessa le articolazioni periferiche, anche se una percentuale di pazienti puÃ² mostrare in aggiunta coinvolgimento assiale. Per le persone con PsA, lâ??impegno assiale puÃ² aggravare una malattia giÃ complessa di per sÃ©: lâ??infiammazione cronica della colonna vertebrale e delle

articolazioni sacroiliache puÃ² infatti causare mal di schiena e rigiditÃ , limitando in questo modo la mobilitÃ e la funzionalitÃ fisica dei pazienti.

In Europa si stima che la PsA interessi 2 adulti su 1.000 e di questi, secondo uno studio internazionale, circa il 27% presenta anche un impegno assiale. Nonostante i progressi terapeutici, questa forma rimane difficile da classificare, tanto che sono pochi gli studi clinici prospettici ed Ã¨ evidente la necessitÃ di avere dati e riscontri clinici in questo sottotipo di pazienti.

â??In Johnson & Johnson il nostro impegno Ã¨ rivolto allâ??avanzamento della ricerca scientifica sullâ??artrite psoriasica in modo tale che i dati generati esprimano pienamente la complessitÃ della malattia e rispondano alle reali esigenze dei pazient â?? commenta Mark Graham, responsabile dellâ??area terapeutica di Immunologia in J&J Innovative Medicine Emea â?? Star Ã¨ il primo studio specifico, randomizzato e controllato con placebo su un inibitore dellâ??Il-23 in pazienti con artrite psoriasica e impegno assiale. Lo studio dimostra che guselkumab Ã¨ in grado di migliorare i sintomi assiali e lâ??infiammazione rilevata alla risonanza magnetica, rafforzando cosÃ¬ il suo potenziale nel trattare le diverse manifestazioni dellâ??artrite psoriasicaâ?•, conclude.

default watermark

â??

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione
Novembre 24, 2026
Autore
redazione