




Aviaria si diffonde in Ue, 60 focolai in 3 settimane. Ciccozzi: «Colpa degli allevamenti intensivi»•

Descrizione

(Adnkronos) «

L'influenza aviaria continua a diffondersi nell'Unione europea. In meno di un mese, alla Commissione europea sono stati notificati 60 nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (Hpa1). Lo riporta una decisione di esecuzione della Commissione consultata dall'Adnkronos, che fa un quadro aggiornato della diffusione dell'infezione in Europa. La malattia, che circola rapidamente durante l'inverno, può trasmettersi all'uomo, in alcuni casi, e viene monitorata con attenzione dai virologi per il rischio che il virus muti e possa diventare trasmissibile da uomo a uomo.

L'epidemiologo romano Massimo Ciccozzi ricorda che l'influenza aviaria è un'influenza che conosciamo da 100 anni circa: l'uomo si infetta direttamente dall'animale che ha il virus. A oggi non è stato dimostrato il contagio interumano, che è il vero spauracchio perché il tasso di letalità è intorno al 35-40%. Il vero problema è che questo virus muta facilmente, e può fare passaggi da un animale all'altro: la situazione si complica e aumenta il rischio, e questo bisogna evitarlo poiché essendo le mutazioni casuali non sappiamo se può accadere una mutazione che permette lo spillover all'uomo e quindi il contagio interumano. Come evitare le continue mutazioni? Evitando gli allevamenti intensivi, che oggi hanno una complicità nella diffusione dei focolai in Italia e in Europa, e facendo una sorveglianza veterinaria continua, afferma all'Adnkronos Salute.

L'Italia sta affrontando focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, principalmente il ceppo H5N1, che da settembre 2025 hanno colpito soprattutto le regioni del Nord (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia) in allevamenti di tacchini e galline ovaiole. ricorda Ciccozzi con misure di contenimento immediate e istituzione di zone di protezione/sorveglianza. La causa è attribuita agli uccelli selvatici migratori, ma il ministero della Salute e gli Istituti zooprofilattici raccomandano il massimo livello di biosicurezza per gli allevatori e attenzione alla segnalazione di casi sospetti, assicurando che i controlli rendono carni e uova sicure per il consumo umano.

L'â€influenza aviaria, ricorda la Commissione, Ãˆ una malattia infettiva virale dei volatili che puÃ² avere â€gravi conseguenzeâ€• per la redditivitÃˆ degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'â€interno dell'Unione e le esportazioni verso i Paesi terzi. I virus dell'â€Hpai, sottolinea, â€possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffonderli a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaveriliâ€•. Di conseguenza, â€la presenza di virus dell'â€Hpai negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di Hpai vi Ãˆ il rischio che lâ€agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattivitàâ€•.

Per questo motivo lâ€Ue adotta misure rigorose di protezione e contenimento della malattia, che perÃ² continua a diffondersi. â€Dalla data di adozione della decisione di esecuzione Ue 2025/2660 (23 dicembre 2025, ndr) â€ riporta la Commissione â€ Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di Hpai sul loro territorio in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattivitàâ€•. Si tratta di ben â€60 nuovi focolaiâ€•, indica la decisione.

Le notifiche â€ viene indicato â€ hanno riguardato in particolare 1 focolaio nel pollame nella provincia delle Fiandre Occidentali in Belgio, 2 focolai nel pollame nelle regioni di Pazardzhik e Plovdiv in Bulgaria, 2 focolai nel pollame nella regione di Vysočina in Cechiaâ€•. Si sono registrati poi â€1 focolaio nel pollame nella regione dello Jutland centrale in Danimarcaâ€• e â€9 focolai nel pollame nei Länder Baden-Württemberg, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Bassa Sassonia, Sassonia e Renania settentrionale-Vestfalia in Germaniaâ€•. E ancora: â€Un focolaio nel pollame nella provincia di Lleida in Spagna, 5 focolai nel pollame nei dipartimenti seguenti Bretagne, Drôme, Hauts-de-France, Pays de la Loire e Vendée in Francia, 7 focolai nel pollame nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto in Italia, 2 focolai nel pollame nella contea di Csongrád-Csanád in Ungheria, 5 focolai nel pollame nelle province del Limburgo e del Brabante settentrionale nei Paesi Bassiâ€•. Sono poi stati notificati alla Commissione â€20 focolai nel pollame nei voivodati di Lublino, di Lubusz, della Podlachia, della Pomerania, della Grande Polonia e di Łódź, e 1 focolaio in volatili in cattività nel voivodato della Bassa Slesia in Polonia, 1 focolaio nel pollame nel distretto di Santarém in Portogallo, e 3 focolai nel pollame nella contea di Skåne in Sveziaâ€•.

In seguito alla comparsa di questi nuovi focolai, conclude la Commissione, â€Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato Ue 2020/687, compresa lâ€istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolaiâ€•.

â€

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Gennaio 15, 2026

Autore

redazione

default watermark